

Листок-вкладыш – информация для потребителя
ТИМОЛОЛ-ЛОНГ, раствор (капли глазные), 5 мг/мл
Действующее вещество: тимолол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ТИМОЛОЛ-ЛОНГ и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ.
3. Применение препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат ТИМОЛОЛ-ЛОНГ,
и для чего его применяют**

Действующим веществом препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ является тимолол, который относится к группе препаратов, называемых бета-адреноблокаторами. Тимолол снижает внутриглазное давление. ТИМОЛОЛ-ЛОНГ применяется для лечения глаукомы – заболевания, при котором повышено внутриглазное давление.

**2. О чем следует знать перед применением препарата
ТИМОЛОЛ-ЛОНГ**

Не применяйте данный препарат, если:

- у Вас аллергия на тимолол, другие бета-адреноблокаторы или любой другой компонент препарата, указанный в разделе 6
- у Вас есть или когда-либо были хронические заболевания дыхательных путей, такие как бронхиальная астма, тяжелый хронический обструктивный бронхит (тяжелое заболевание легких, которое может проявляться хрипами, затруднением дыхания и/или кашлем)
- у Вас замедленное сердцебиение
- у Вас нарушен сердечный ритм
- у Вас сердечная недостаточность или кардиогенный шок (состояние, возникающее при очень низком артериальном давлении, которое может проявляться головокружением, учащенным сердцебиением, бледностью кожи, потливостью или потерей сознания)
- применение ТИМОЛОЛ-ЛОНГ противопоказано до 18 лет.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед применением препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у Вас есть или когда-либо были:

- ишемическая болезнь сердца (может проявляться болью или тяжестью в груди, одышкой) или сердечная недостаточность
- низкое артериальное давление
- нарушения сердечного ритма, такие как замедленное сердцебиение
- затруднение дыхания, астма или хроническая обструктивная болезнь легких
- нарушения кровообращения (синдром Рейно)
- сахарный диабет (тимолол может маскировать признаки низкого уровня сахара в крови)
- повышенная активность щитовидной железы (тимолол может маскировать симптомы).

Если Вам необходима операция, сообщите врачу, что применяете ТИМОЛОЛ-ЛОНГ, поскольку он может повлиять на действие препаратов, которые применяются при анестезии.

ТИМОЛОЛ-ЛОНГ содержит бензалкония хлорид, который может раздражать глаза.

Если у Вас возникнет раздражение глаз или другие проблемы с глазами, такие как покраснение или отек век (см. раздел 4), немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы считаете, что у Вас возникла аллергическая реакция на ТИМОЛОЛ-ЛОНГ (сыпь, зуд или покраснение глаза), прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу.

Сообщите врачу, если:

- у Вас возникнет инфекция глаза
- Вы пораните глаз или Вам потребуется операция на глазах
- Ваши проблемы с глазами усиливаются или появляются новые симптомы.

Если Вы носите контактные линзы

Избегайте контакта с мягкими контактными линзами. Перед применением препарата снимите контактные линзы и не ранее, чем через 15 минут, наденьте их обратно. ТИМОЛОЛ-ЛОНГ может изменять цвет мягких контактных линз.

Другие препараты и препарат ТИМОЛОЛ-ЛОНГ

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится и к глазным каплям, и к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете:

- антагонисты кальция, такие как нифедипин, верапамил или дилазем, которые применяются для лечения высокого артериального давления, стенокардии, нарушений сердечного ритма и нарушений кровообращения (синдрома Рейно)
- дигоксин, который применяется для лечения сердечной недостаточности или нарушений сердечного ритма
- препараты, снижающие уровень адреналина, такие как алкалоиды раувольфии или резерпин, которые применяются для снижения артериального давления
- прессорные амины, такие как адреналин, которые применяются для лечения тяжелых аллергических реакций
- хинидин, который применяется для лечения заболеваний сердца и некоторых типов малярии
- антидепрессанты, такие как флуоксетин и пароксетин
- клонидин, который применяется для снижения артериального давления
- другие бета-адреноблокаторы, которые применяются внутрь или в виде глазных капель, поскольку они принадлежат к той же группе препаратов, что и ТИМОЛОЛ-ЛОНГ

ЛОНГ, и могут усиливать его эффект.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед началом применения препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ. Не применяйте ТИМОЛОЛ-ЛОНГ во время беременности, если Ваш лечащий врач не считает это необходимым.

Не применяйте ТИМОЛОЛ-ЛОНГ, если Вы кормите ребенка грудью, поскольку тимолол проникает в грудное молоко.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

ТИМОЛОЛ-ЛОНГ может вызывать временное нарушение четкости зрения, которое обычно длится от 30 секунд до 5 минут, в редких случаях – до 30 минут и более. После применения препарата возможны головокружение, слабость и временные зрительные расстройства, такие как нечеткость зрения, опущение верхнего века (из-за чего глаз остается полузакрытым) и двоение в глазах. В случае возникновения этих реакций воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами до тех пор, пока Ваше самочувствие не улучшится и зрение не станет четким.

3. Применение препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Доза

Лечащий врач определит необходимую Вам дозу препарата. Не изменяйте дозу препарата без консультации с врачом.

Обычная доза составляет по 1 капле в каждый пораженный глаз 1 раз в день.

При необходимости допускается применение по 1 капле каждые 12 часов.


Если помимо этого препарата Вам нужно применять другие глазные капли, закапывайте их не менее чем за 10 минут до препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ.

Способ применения

Перед применением внимательно прочитайте этот раздел и последовательно выполните операции, представленные ниже в тексте и на рисунках 1-6.

1. Достаньте из упаковки флакон.
2. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым: расположите ножницы под углом 45 градусов к крышке, подцепив её нижний край, движением, направленным вверх, снимите алюминиевый колпачок вместе с резиновой крышкой (рис. А 1-2).
3. Если флакон укупорен колпачком алюминиевым с пластиковой накладкой: с усилием потяните за пластиковую накладку со стороны надрезов, поднимая ее вертикально, затем резко потяните вниз вдоль флакона для нарушения целостности колпачка. Снимите алюминиевый колпачок и резиновую пробку (рис. Б 1-2).
4. Достаньте капельницу из упаковки и плотно наденьте ее на флакон (рис. 3).
5. Переверните флакон строго вертикально для удаления воздушного пузырька и подождите несколько секунд. В случае большого пузырька верните флакон в исходное положение, а затем медленно повторите действие, аккуратно постучав по дну флакона (рис. 4).
6. Закапайте капли, нажимая указательным и большим пальцем на пипетку (рис. 5). Не прикасайтесь пипеткой к глазу или другим поверхностям – это может привести к инфицированию раствора.
7. Перевернув флакон, закройте пипетку специальной пробкой (рис. 6).

А



Б




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Если Вы применили препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ больше, чем следовало

Если Вы закапали слишком большую дозу препарата или проглотили некоторое количество, у Вас могут возникнуть следующие симптомы: головная боль, головокружение или слабость, затруднение дыхания, боль в груди, замедленное сердцебиение. При появлении этих симптомов немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить препарат ТИМОЛОЛ-ЛОНГ

Если Вы забыли закапать ТИМОЛОЛ-ЛОНГ, сделайте это, как только вспомните. Если уже почти настало время для закапывания следующей дозы, закапайте следующую дозу в обычное время. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если Вы досрочно прекращаете применение препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ

Если Вы желаете прекратить применение препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ, проконсультируйтесь с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ТИМОЛОЛ-ЛОНГ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Продолжайте применение препарата, если нежелательные реакции не являются серьезными. Если они Вас беспокоят, обратитесь к врачу. Не прекращайте применение препарата без консультации с врачом.

Как и другие глазные капли, ТИМОЛОЛ-ЛОНГ всасывается в кровь. Это может приводить к развитию таких же нежелательных реакций, как при использовании бета-адреноблокаторов, которые принимают внутрь или вводят внутривенно. Частота нежелательных реакций при использовании глазных капель ниже, чем приеме препаратов внутрь или при внутривенном введении. Перечисленные ниже нежелательные реакции возникали при применении препаратов из группы бета-адреноблокаторов для лечения заболеваний глаз.

Немедленно прекратите применение препарата и обратитесь к врачу в случае развития следующих симптомов:

- отек лица или конечностей, затруднение глотания или дыхания, крапивница или

зудящая сыпь, зуд, сыпь, тяжелая угрожающая жизни аллергическая реакция

Могут возникать следующие нежелательные реакции:

- капиллярные кровоизлияния, проявляющиеся красной сыпью
- системная красная волчанка, зуд, аллергические реакции
- пониженный или повышенный уровень сахара в крови
- депрессия, бессонница, ночные кошмары, потеря памяти, снижение концентрации, увеличение сновидений
- обморок, нарушение кровоснабжения головного мозга, головная боль, головокружение, усиление проявления признаков и симптомов мышечной слабости, ощущение покалывания или жжения, головокружение, местная слабость
- признаки и симптомы раздражения глаза (жжение, покалывание, зуд, слезотечение, покраснение), воспаление слизистой оболочки глаза, воспаление краев век, воспаление роговицы глаза, сухость глаза, снижение чувствительности роговицы, эрозия роговицы. Расстройства зрения, включая изменения рефракции, двоение в глазах, опущение верхнего века, отслойка сосудистой оболочки глаза после операции фильтрации
- шум в ушах
- замедленное сердцебиение, боль в груди, нарушение сердечного ритма, нарушение проведения электрического импульса по сердцу, застойная сердечная недостаточность (проявляется одышкой и отеками ног), ощущение сердцебиения, остановка сердца, сердечная недостаточность, учащенное сердцебиение, отек, отек легких, прогрессирование артериальной недостаточности, прогрессирование стенокардии, расширение кровеносных сосудов
- нарушения кровообращения, низкое артериальное давление, синдром Рейно, холодные руки и ноги
- спазм бронхов, дыхательная недостаточность, одышка, кашель, хрипы
- тошнота, диарея, диспепсия, сухость во рту, извращение вкуса, боль в животе, рвота
- выпадение волос, кожная сыпь, псориазоподобная сыпь, обострение псориаза, потливость, покраснение и шелушение кожи
- боль в мышцах, боль в суставах
- снижение полового влечения, болезнь Пейрони (проявляется искривлением полового члена и болью), сексуальные дисфункции, такие как импотенция, затруднение мочеиспускания
- слабость, боль в конечностях, снижение толерантности к физической нагрузке.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.


5. Хранение препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.



Не использовать по истечении срока годности.

Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C в течение 28 дней.

Не выливайте остатки препарата в канализацию и не выбрасывайте с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Один флакон содержит *действующее вещество*: тимолол (в виде тимолола малеата) – 25,0 мг. Одна капля соответствует 0,042 мл лекарственного средства (0,21 мг тимолола малеата в одной капле).

Вспомогательные вещества: динатрия фосфат дигидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, повидон, гипромеллоза (Метоцел Е4М Премиум), вода для инъекций.

Внешний вид препарата ТИМОЛОЛ-ЛОНГ и содержимое упаковки

ТИМОЛОЛ-ЛОНГ, раствор (капли глазные), 5 мг/мл – прозрачная бесцветная или желтоватого цвета жидкость.

Упаковка

По 5 мл во флаконы стеклянные, закупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками. Флакон вместе с крышкой-капельницей и листком-вкладышем помещен в пачку из картона.

Условия отпуска: По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220 37 16

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: