


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного средства

ХОНДРОКСИД

Торговое название: Хондроксид.

Международное непатентованное название: -

Форма выпуска: мазь для наружного применения.

Описание: мазь светло-желтого цвета с запахом диметилсульфоксида.

Состав на одну тубу:

активные вещества: хондроитина сульфата натрия – 1,5 г, диметилсульфоксида – 3,0 г;

вспомогательные вещества: ланолин, парафин мягкий белый, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах.

Код АТС: M02AX10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Хондроитина сульфат – мукополисахарид и один из компонентов хряща. Он отличается высокой способностью связывать воду, таким образом, он обеспечивает механические и упругие свойства хряща.

При дегенеративных процессах в суставах наблюдается уменьшение запасов хондроитина сульфата в хрящевой ткани, вызванное конкретными литическими ферментами. В результате ухудшения способности связывать воду, прогрессирует повреждение суставного хряща и нарушение функции суставов.

Хондроитина сульфат *in vitro* подавляет эластазы, разрушающие хрящ.

Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, оказывает противовоспалительное, анальгетическое и фибринолитическое действие, способствует лучшему проникновению активного вещества (хондроитина сульфата) через клеточные мембраны.

Фармакокинетика

Хондроитина сульфат хорошо проникает через кожу. Согласно данным, полученным в экспериментальных исследованиях на животных с использованием радиомеченого H^3 -хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14%. Диметилсульфоксид способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата вглубь тканей.

Показания к применению

Местное облегчение симптомов боли и воспаления при остеоартрите поверхностных суставов и остеохондрозе позвоночника.

Способ применения и дозы

Мазь применяют наружно, наносят 2-3 раза в день на область пораженного сустава из расчета 1-2 г на 100-200 см² кожи и мягко втирают до полного впитывания в течение 2-3 минут. Столбик мази в 1 см, выдавленный из тубы, соответствует 0,3 г. Курс лечения 2-3 недели. При необходимости курс лечения повторяют.

Данные об эффективности и безопасности применения Хондроксида у детей в настоящее время отсутствуют.

Побочное действие

Частота развития побочных эффектов приведена в следующей градации: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$); неизвестно (по имеющимся данным определить частоту встречаемости не представляется возможным).

Редко: аллергические реакции, гиперемия, зуд. При возникновении аллергических реакций лечение препаратом следует прекратить, в случае резкого покраснения и зуда следует провести десенсибилизирующую терапию.

Противопоказания

Гиперчувствительность, склонность к кровотечениям, тромбозы, повреждение кожных покровов, детский возраст (эффективность и безопасность применения препарата не установлены), беременность, период лактации (необходимо прекратить грудное вскармливание на период лечения).

Передозировка

Явления передозировки при применении лекарственного средства не описаны.

Меры предосторожности

Следует наносить на неповрежденные участки кожи.

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны.

Специальные меры предосторожности не требуются.

Информация о вспомогательных веществах. Лекарственное средство содержит ланолин, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Применение во время беременности и в период лактации. Противопоказано применение препарата во время беременности и в период лактации.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами. Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не установлено случаев негативного лекарственного взаимодействия при назначении Хондроксида мази с другими лекарственными средствами, включенными в общепринятые схемы лечения дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 30 г в тубах. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель:

РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

