


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению лекарственного средства
ВИТАДЕН

Торговое название: Витаден.

Международное непатентованное название: нет.

Форма выпуска: раствор (капли глазные).

Описание: прозрачный бесцветный раствор.

Состав на одну тюбик-капельницу: активные вещества – магния хлористого 6-водного – 3,0 мг, кальция хлорида – 3,0 мг, никотиновой кислоты – 0,3 мг, аденоцина – 1,0 мг; вспомогательные вещества – натрия хлорид, бензалкония хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие офтальмологические средства.

Код ATC: S01XA.

Фармакологическое действие

Витаден – комбинированный препарат для местного применения в офтальмологии. Витаден улучшает обмен веществ и кровоснабжение глазного яблока.

Аденозин и никотиновая кислота играют важную роль в энергетическом метаболизме хрусталика. Магния хлорид и кальция хлорид наряду с аденоцином и никотиновой кислотой за счет улучшения трофики хрусталика препятствуют образованию катаракты и ее прогрессированию у пациентов пожилого возраста.

Показания к применению

Катаракта (старческая, миопическая, лучевая, травматическая и др.) в начальной стадии.

Способ применения и дозы

Конъюнктивально.

Взрослым закапывают в пораженный глаз по 1-2 капли 2-3 раза в сутки. Препарат применяют длительно.

Рекомендации по использованию тюбик-капельницы: перед применением лекарственного средства снять с тюбик-капельницы защитный колпачок, ножницами отрезать мембрану горловины корпуса, не повреждая резьбовую часть. Перевернуть корпус тюбик-капельницы с лекарственным средством горловиной вниз и мягким движением нажать на корпус тюбик-капельницы, используя его как пипетку. После применения рекомендуемой по назначению врача или указанной в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства дозы, корпус тюбик-капельницы перевернуть резьбовой частью вверх и накрутить защитный колпачок.

Побочное действие

Местные: кратковременное жжение, зуд, гиперемия, пощипывание глаз, контактная аллергия и контактный конъюнктивальный дерматит.

Системные эффекты наблюдаются крайне редко: тошнота, артериальная гипотония, головокружение и одышка очень кратковременно. Никотиновая кислота обладает сосудорасширяющим действием и может вызвать приливы, ощущение жара, обмороки и ощущение пульсации в висках.

В случае возникновения вышеуперечисленных побочных реакций или побочных реакций, не указанных в данной инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата, в том числе к бензалкония хлориду.

Передозировка

Явления передозировки при применении лекарственного средства не описаны.

Меры предосторожности

При применении препарата не требуется специальных мер предосторожности.

При прогрессировании заболевания на фоне применения препарата следует рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения лечения.

В период лечения препарат не следует применять при использовании мягких контактных линз в связи с опасностью абсорбции бензалкония хлорида.

Глазные капли Витаден нельзя принимать внутрь или вводить в виде инъекций.

В случае травматической катаракты при остроте зрения не менее 0,5 лечение назначают не ранее 2-3 месяцев после травмы.

Использование в педиатрии. Безопасность применения препарата Витаден у детей не установлена.

Применение во время беременности и в период лактации. Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и в период лактации нет. Возможно применение препарата у беременных женщин и кормящих матерей в том случае, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В случае применения Витадена с другими офтальмологическими лекарственными средствами необходимо соблюдать промежуток в 15 минут между их применением.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 1 мл в тюбик-капельницах. По 2 или 10 тюбик-капельниц вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель:

РУП "Белмедпрепараты",
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

